

症例検討：がん性疼痛におけるオピオイドの使用事例

年齢 41 歳 女性

子宮頸癌術後ターミナル

合併症：肛門周囲膿瘍、人口肛門

その他：左下腿感覚鈍麻、左臀部痛

H19.12.12

オキシコンチン錠 40mg 3T/3N*14

タガメット錠 200mg 2T/2N*14

ワーファリン錠 1mg 0.5T/1N*14

モービック錠 10mg 1T/1N*14

ガチフロ錠 100mg 4T/2N*14

H19.12.19

ラキソベロン液 20ml

H19.12.26

オキシコンチン錠 40mg 3T/3N*14

タガメット錠 200mg 2T/2N*14

ワーファリン錠 1mg 0.5T/1N*14

モービック錠 10mg 1T/1N*14

ガチフロ錠 100mg 4T/2N*14

プルゼニド錠 2T/VDS*14

H20.1.9

オキシコンチン錠 40mg 3T/3N*14

オメプラール錠 20mg 1T/1N*14

ワーファリン錠 1mg 0.5T/1N*14

モービック錠 10mg 1T/1N*14

ガチフロ錠 100mg 4T/2N*14

H20.1.18

ナウゼリン錠 10mg 3T/3V*6

H20.1.19

デュロテップパッチ 2.5m g 1 枚

デュロテップパッチ 5m g 1 枚

H20.1.22

デュロテップパッチ 2.5m g 2 枚

デュロテップパッチ 5m g 2 枚

H20.1.23

デュロテップパッチ 2.5m g 2 枚

デュロテップパッチ 5m g 2 枚

ナウゼリン錠 10m g 3T/3V*14

ラキソベロン液 20m l

H20.1.30

リンデロン錠 0.5m g 1 T/1N*8

オキシコンチン錠 40m g 2T/2N*8

ナウゼリン錠 10m g 3T/3V*8

デュロテップパッチ 10m g 4 枚

H20.2.6

リンデロン錠 0.5m g 1 T/1N*8

オキシコンチン錠 40m g 2T/2N*8

ナウゼリン錠 10m g 3T/3V*8

デュロテップパッチ 10m g 4 枚

酸化マグネシウム 0.5 g 20 回分

H20.2.13

リンデロン錠 0.5m g 1 T/1N*7

オキシコンチン錠 40m g 3T/3N*7

ナウゼリン錠 10m g 3T/3V*7

デュロテップパッチ 10m g 4 枚

酸化マグネシウム 0.5 g 20 回分

注意) 外用薬は記載していません。

H20.3.12 平成調剤薬局 長良店