


CyBorD 療法 (VCD 療法)

エンドキサン錠 50mg 9T 分1 朝食後 (週1回) 4日分
 レナデックス錠 4mg 10T 分2 朝夕食後 (週1回) 4日分

オキシコンチン錠 5mg 2T 分2 朝夕食後 28日分
 マグミット錠 250mg 3T 分3 毎食後 28日分
 パントシン錠 100mg 3T 分3 毎食後 28日分
 ナウゼリン錠 10mg 3T 分3 毎食前 14日分
 センノシド錠 12mg 2T 便秘時 28回分
 ラキソベロン液 10mL 便秘時
 ゾルピデム錠 5mg 1T 不眠時 10回分

ベルケイドは、プロテアソーム阻害剤で高価。1本 137409円

エンドキサンは、シクロホスファミド。アルキル化剤の抗がん剤。薬価 33.9円
 レナデックスは、デキサメタゾン (ステロイド) なので安価だが、それでも薬価 173.8円




造血幹細胞が分化して出来る形質細胞のガンが多発性骨髄腫。

形質細胞は、B細胞から分化して細菌やウイルスに対する抗体を作ります。

形質細胞がガン化して異常増殖を繰り返すと病気を発症します。

多発性骨髄腫の症状

様々な造血過程が阻害されるため、貧血、免疫機能低下、出血傾向を生じることがあり、骨髄腫細胞が異常免疫グロブリンを大量に作り出されることで免疫低下、腎障害、血液循環の過粘稠症候群が起き、各臓器の機能低下を引き起こし多様な症状を引き起こすことがある。



注意すべき検査項目

IgM、WBC (白血球数)、RBC (赤血球数)、血小板数など

副作用の初期症状

肺障害、心機能障害、末梢神経障害、皮疹

強い疼痛に関しては、モルヒネやオキシコドン等の麻薬を使用します。

<参考資料>

国立がん研究センター、がん研有明病院 血液腫瘍科